

Ítem	Descripción del Bien	Dictamen Justificativo de los los medicamentos a ser adquiridos
1	Clorfeniramina inyectable	Clorfeniramina Inyectable: para el alivio de las reacciones alérgicas a sangre o plasma, en el tto de reacciones anafilácticas conjuntamente con epinefrina y otras medidas de rigor después de controlar las manifestaciones agudas y, en otras afecciones alérgicas no complicadas y de tipo inmediato cuando el tto por vía oral es imposible o está Contraindicaciones Jarabe: para el tto. sintomático de la rinitis alérgica estacional y perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, manifestaciones alérgicas cutáneas no complicadas y angioedema; mejoramiento de reacciones alérgicas a sangre o plasma; también esta Indicaciones terapéuticas en el tto de reacciones anafilácticas, conjuntamente con epinefrina; a menudo alivia las afecciones cutáneas como eccema alérgico, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, picaduras de insectos, dermatografismo y reacciones medicamentosas.
2	Dexametasona inyectable	Las aplicaciones de Doxatar son las de los esteroides en general, a saber: procesos alérgicos, inflamaciones inespecíficas (colagenosis artritis reumatoidea, lupus eritematoso, esclerodermia, dermatomiositis), crisis anafilácticas, shock, crisis de intolerancia a medicamentos, discrasias sanguíneas, púrpuras, mieloma, síndrome de Hodgkin, nefrosis.
3	Diclofenac sodico Inyectable	Diclofenac sódico es un antiinflamatorio que posee actividades analgésicas y antipiréticas y está indicado por vía oral e intramuscular para el tratamiento de enfermedades reumáticas agudas, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, artrosis, lumbalgia, gota en fase aguda, inflamación postraumática y postoperatoria, cólico renal y biliar, migraña aguda, y como profilaxis para dolor postoperatorio y dismenorrea. Este medicamento se encuentra dentro del mercado y su venta requiere receta médica.
4	Dipirona inyectable	La dipirona (metamizol) es un analgésico y antipirético del grupo de las pirazononas; se considera un derivado soluble de la aminopirina, y comparte con ésta sus riesgos de toxicidad; entre ellos, la posibilidad de causar agranulocitosis. También tiene propiedades antiinflamatorias y espasmolíticas, cuantitativamente de menor magnitud. Igual que otros miembros del grupo, la dipirona inhibe la acción de la ciclooxigenasa y en consecuencia, la síntesis de prostaglandinas, acción que parece explicar sus propiedades analgésicas y antipiréticas.
5	Domperidona gotas	Este medicamento es utilizada contra las náuseas y vómitos cualquiera sea la edad y etiología. Dispepsias. Hernia hiatal con reflujo. Reflujo gastro-esofágico con o sin esofagitis. Pirosis. Gastritis aguda y crónica. Úlcera gástrica y duodenal. Duodenitis. Vagotomizados. Eructos. Flatulencia. Preparación para estudios con fines diagnósticos. Náuseas y vómitos producidos por agonistas dopaminérgicos en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Tiene efecto emetógeno leve a moderado en las náuseas y vómitos producidos durante la quimioterapia
6	Enalaprilato (enalapril Inyectable)	Según las indicaciones terapéuticas, está indicado en la terapéutica de la hipertensión arterial (cuando es conveniente el uso de la vía parenteral) y de la insuficiencia cardíaca.
7	Furosemida Inyectable	Furosemida es un diurético (agente que aumenta la eliminación de orina y disminuye la presión arterial) que pertenece al grupo de las sulfonamidas, es utilizado para tratamientos por trastornos cardíacos, hepáticos, renales, por quemaduras. Hipertensión leve o moderada, crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia rena. crónica (incluso terminal), falla renal aguda, síndrome nefrótico. Soporte de la diuresis forzada en casos de envenenamiento.
8	Hidrocortisona inyectable	La hidrocortisona se usa sola o con otros medicamentos para tratar los síntomas de niveles bajos de corticosteroides (falta de ciertas sustancias que normalmente produce el organismo y que son necesarias para el funcionamiento normal del cuerpo). La hidrocortisona también se usa para tratar otras afecciones en pacientes con niveles normales de corticosteroides. Estas afecciones incluyen ciertos tipos de artritis; reacciones alérgicas graves; lupus (una enfermedad en la que el cuerpo ataca muchos de sus propios órganos); y ciertas afecciones que afectan los pulmones, la piel, los ojos, los riñones, la sangre, la tiroides, el estómago y los intestinos. A veces también se usa para tratar los síntomas de ciertos tipos de cáncer. La hidrocortisona se encuentra en una clase de medicamentos llamados corticosteroides. Funciona para tratar a pacientes con niveles bajos de corticosteroides al reemplazar los esteroides que el cuerpo produce naturalmente durante el funcionamiento normal. Su acción consiste en tratar otras afecciones reduciendo la hinchazón y el enrojecimiento y modificando el funcionamiento del sistema inmunitario.
9	Iodopovidona Jabon Liquido	Solución cutánea: antiséptico de la piel de uso general, en pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves, rozaduras. En el ámbito hospitalario, indicado como antiséptico del campo operatorio, zonas de punción, pequeñas heridas, quemaduras leves y material quirúrgico. Gel: antiséptico de la piel de uso general, pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves, rozaduras. Solución jabonosa: lavado antiséptico de las manos y de la piel.
10	Iodopovidona Solucion	Es utilizado normalmente para desinfección de heridas, infecciones de piel, quemaduras, preparación de campo operatorio; aplicar la solución pura. Para el lavado en el pre y post operatorios; aplicar la solución diluida en partes iguales con agua. Para lavados vaginales: diluir 1 cucharada de solución en 250 ml de agua. Es de venta libre.
11	Ketorolac inyectable	Tratamiento a corto plazo del dolor leve a moderado en el postoperatorio y en traumatismos musculoesqueléticos; dolor causado por el cólico nefrítico. Está indicado en dolor post-traumático y de músculo esquelético, dolor ginecológico, cólicos renales y biliares, dolor post-operatorio, dolor dental y dolores crónicos en general.
12	Metoclopramida Gotas	Metoclopramida se usa para prevenir vómitos y náuseas de cualquier origen (central o periférico). Profilaxis y tratamiento de náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia. Gastroparesia diabética. Reflujo gastroesofágico. Tratamiento a corto plazo de pirosis y vaciamiento gástrico retardado. Coadyuvante de la radiografía gastrointestinal.

13	Adrenalina Inyectable	La adrenalina pertenece al grupo de los medicamentos denominados estimulantes cardíacos, excluyendo glucósidos cardíacos: agentes adrenérgicos y dopaminérgicos. Está indicado en los siguientes casos. Tratamiento de la contracción muscular involuntaria y súbita de las vías aéreas en ataques agudos de asma (sensación repentina de ahogo). Alivio rápido de reacciones alérgicas a fármacos o a otras sustancias. Tratamiento de emergencia del shock debido a una reacción alérgica. Paro cardíaco y reanimación cardiopulmonar (en primer lugar deben aplicarse medidas de tipo físico).
13	Suero Fisiológico Solución	Este medicamento es utilizado para la hidratación parenteral en casos de suspensión de la vía oral y como tratamiento de la deshidratación isotónica. Reposición inicial en el shock hipovolémico, en el déficit de sodio o cloruro y en la alcalosis metabólica (de contracción). Vehículo de medicación parenteral. También se usa en el lavado de heridas y en enemas.
14	Suero Ringer Lactato - Solución	Ringer Lactato Solución Inyectable está destinado a la administración intravenosa utilizando equipo estéril y no pirogénico. Este medicamento está indicado como una fuente de agua y electrolitos o como un agente alcalinizante.
15	Dextrosa hipertónica - solución parenteral	La dextrosa al 5 % (glucosa) es un monosacárido administrado por vía intravenosa en el tratamiento de depleción de carbohidratos y fluidos. Esta es la fuente de carbohidratos de elección en regímenes de nutrición parenteral y es usada combinada con soluciones de electrolitos en la prevención y tratamiento de deshidratación debido a diarreas agudas.
16	Alprazolam comprimido	Este medicamento está indicado para el control de los desórdenes de ansiedad o para el alivio a corto plazo de los síntomas de la ansiedad. Indicado en los estados de ansiedad simple, que pueden incluir ansiedad, tensión, trastorno de pánico, temores, aprensión, dificultad de concentración. Ansiedad asociada a depresión.
17	Acido ascorbico en polvo	Este tipo de medicamento es Indicado normalmente para el refuerzo de defensas específicas e inespecíficas contra todo tipo de infección.
18	Atenolol comprimido	Atenolol está indicado en el tratamiento de la presión arterial elevada , para ayudar a prevenir el dolor de pecho (angina), para garantizar latidos cardíacos regulares y también, para proteger al corazón durante y después de un ataque cardíaco.
19	Cefazolina inyectable	La inyección de cefazolina se utiliza para tratar ciertas infecciones ocasionadas por bacterias, incluso la piel, huesos, articulaciones, genitales, sangre, válvula del corazón, tracto del sistema respiratorio (incluyendo la neumonía), tracto biliar, e infecciones del tracto urinario
20	Clorfeniramina Maleato comprimido	Clorfenamina se usa para el alivio de los síntomas o profilaxis de estados alérgicos, tales como: Rinitis alérgica estacional o crónica, secreción nasal excesiva (rinorrea) de origen alérgico o del resfriado común. Conjuntivitis alérgica. Prurito, urticaria y otras manifestaciones alérgicas cutáneas.
21	Diclofenac potásico comprimido	Es un medicamento con propiedades antiinflamatorias y analgésicos notables. La combinación de estas acciones le permite proporcionar un tratamiento eficaz del dolor de naturaleza reumática y no reumática. También es útil en los procesos que cursan con fiebre.
22	Enalapril comprimido	El enalapril es un medicamento que sirve para el tratamiento de la presión alta o de la insuficiencia cardíaca, ya que actúa dilatando los vasos sanguíneos, ayudando a que el corazón funcione mejor y bombee sangre con más facilidad hacia todo el cuerpo. Este medicamento puede encontrarse en farmacias o droguerías en presentación de tabletas de 5, 10 y 20 mg.
23	Labetalol comprimido	El labetalol es un antihipertensivo (agente reductor de la presión arterial) conocido como betabloqueante. Este medicamento reduce la carga de trabajo del corazón y lo ayuda a latir con más regularidad. El labetalol reduce la presión arterial de diferentes maneras. Los valores elevados de presión arterial pueden dañar los riñones y pueden causar un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca
24	Clorfeniramina Maleato Jarabe	Clorfeniramina se usa para el alivio de los síntomas o profilaxis de estados alérgicos, tales como: Rinitis alérgica estacional o crónica, secreción nasal excesiva (rinorrea) de origen alérgico o del resfriado común
25	Omeprazol Comprimido	El Omeprazol es un inhibidor de la secreción ácida gástrica, cuyo mecanismo de acción involucra la inhibición específica de la bomba de hidrogeniones de la célula parietal gástrica. Actúa en forma rápida y produce un control reversible de la secreción ácida del estómago con una sola dosis diaria.
26	Ibuprofeno jarabe	Este medicamento está indicado en todos los procesos que cursan con dolor, inflamación y/o fiebre, solo o en combinación con otros fármacos. Afecciones inflamatorias y dolorosas de tejidos blandos, osteoartritis, artritis reumatoide, dismenorrea, etc.
27	Ibuprofeno comprimido	Este medicamento está indicado para el tratamiento de la fiebre, el tratamiento del dolor de intensidad leve o moderado incluida la migraña, el tratamiento de la artritis (inflamación de las articulaciones, incluyendo habitualmente las de manos y pies, dando lugar a hinchazón y dolor), la artritis reumatoide juvenil, artrosis (trastorno de carácter crónico que ocasiona el daño del cartilago), espondilitis anquilosante (inflamación que afecta las articulaciones de la columna vertebral), inflamación no reumática y la dismenorrea primaria (menstruación dolorosa).
28	Ondansetron inyectable	Este medicamento está indicado para la prevención de las náuseas y los vómitos asociados a los ciclos iniciales o repetidos de quimioterapia citotóxica y radioterapia, incluyendo altas dosis de cisplatino. Se emplea además para la prevención y tratamiento de náuseas y vómitos post operatorio , náuseas y vómitos de cualquier etiología.
29	Amoxicilina comprimido	Amoxicilina tiene acción bactericida, al igual que todos los antibióticos β-lactámicos, gracias a la inhibición de la síntesis de un mucopéptido de la pared celular bacteriana, al interferir la actividad transpeptidasa de las proteínas fijadoras de penicilinas (PBP), existentes en la membrana citoplasmática de las bacterias.
30	Amoxicilina + Sulbactam comprimido	Se solicita este medicamento para tratar las infecciones de vías respiratorias altas y bajas: Sinusitis, amigdalitis, faringitis mastoiditis, otitis, neumonías , etc. Infecciones urinarias: cistitis, uretritis, nefritis, pielonefritis, prostatitis, gonorrea. Infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones odontológicas, colecistitis, enterocolitis, infecciones post-quirúrgicas .

31	Azitromicina comprimido	Este medicamento es indicado en el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la azitromicina; en infecciones del tracto respiratorio inferior (bronquios y pulmones) y superior (nariz, faringe laringe y tráquea), incluyendo sinusitis (infección de los senos faciales), faringitis (inflamación de la faringe) o amigdalitis (inflamación de las amígdalas); infecciones de la piel y tejidos blandos (músculos, tendones, grasa); en otitis media (infección del oído medio) aguda y en las enfermedades sexualmente transmisibles o complicadas en el hombre y en la mujer, debido a la clamidia y gonorrea (tipos de bacterias).
32	Ciprofloxacina comprimido	La ciprofloxacina se usa para tratar o prevenir ciertas infecciones causadas por bacterias como la neumonía; gonorrea (una enfermedad de transmisión sexual); fiebre tifoidea (una infección grave que es común en los países en desarrollo); diarrea infecciosa (infecciones que ocasionan una diarrea intensa); e infecciones de la piel; de los huesos; articulaciones; abdomen (área del estómago) y próstata (glándula reproductiva masculina).
33	Piroxicam comprimido	piroxicam se usa para aliviar algunos síntomas causados por la artrosis (enfermedad degenerativa de las articulaciones), artritis reumatoide y espondilitis anquilosante (reumatismo de la columna), como la inflamación, rigidez y dolor de las articulaciones.
34	Paracetamol - comprimido	PARACETAMOL es un analgésico y antipirético eficaz para el control del dolor leve o moderado causado por afecciones articulares, otitis, cefaleas, dolor odontogénico, neuralgias, procedimientos quirúrgicos menores etc. También es eficaz para el tratamiento de la fiebre, co-mo la originada por infecciones virales, la fiebre pos-vacunación, etcétera.
35	Dipirona / Metamizol comprimido	Este medicamento es un analgésico que también actúa disminuyendo la fiebre y los espasmos musculares. Está indicado en el tratamiento del dolor agudo intenso (postoperatorio, postraumático, cólico, neoplásico) o de la fiebre alta que no responde a otros tratamientos.
36	Prednisona - Comprimido	La PREDNISONA está indicada en el tratamiento de diversas enfermedades reumáticas del colágeno, endocrinas, dermatológicas, alérgicas, oftalmológicas, respiratorias, hematológicas y otras que respondan a la corticoterapia.
37	Citrato de oxolamina jarabe	Está indicado en todos los cuadros respiratorios con tos innecesaria y en los que haya viscosidad de las secreciones, factor agravante de la patología bronquial, traqueitis, laringitis.
38	Acido Acetilsalicílico 125mg Comprimido	El ÁCIDO ACETILSALICÍLICO está indicado como antipirético, antiinflamatorio y como antiagregante plaquetario. También es útil para artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante y fiebre reumática aguda.
39	Valsartan comprimido	El valsartán es un medicamento que actúa bloqueando los receptores de la angiotensina. La angiotensina actúa sobre la pared de los vasos sanguíneos produciendo vasoconstricción y disminuye la producción de orina en el riñón. El valsartán produce la relajación de la musculatura de los vasos con lo que se consigue una disminución de la presión arterial.
40	Metformina - comprimido	La metformina es un fármaco utilizado en el control de la diabetes tipo II (diabetes que no depende de insulina). Actúa principalmente reduciendo la producción de glucosa (azúcar) por parte del hígado. También retrasa la absorción intestinal de glucosa y favorece que la glucosa entre dentro de las células.
41	Espironolactona Comprimido	La espironolactona pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor de la aldosterona. Hace que los riñones eliminen en la orina el agua y el sodio innecesarios del cuerpo, pero reduce la pérdida de potasio del cuerpo.
42	Atorvastatina comprimido	Atorvastatina Normon se utiliza para reducir los lípidos como el colesterol y los triglicéridos en la sangre cuando una dieta baja en grasas y los cambios en el estilo de vida por si solos han fracasado.



CIRIA SOLEDAD ZARATE ALVARENGA
Ite 1º Int Girador - Hospital del Ejército