



18% off



GADOR

 En stock

Propranolol Gador 40 mg - Caja de 50 comprimidos

CÓD: 612910 Cód BARRAS: 7792183105667



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

₡. 29.848

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 29.848

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo***Cantidad** 1 

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Betabloqueante adrenérgico no cardiosselectivo, sin actividad agonista. Antiarrítmico. Hipotensor arterial.

Descripción**INDICACIONES**

Hipertensión arterial, arritmias supraventriculares y ventriculares (arritmia inducida por catecolaminas, intoxicación digitálica), angina de pecho. Miocardiopatía obstructiva hipertrófica. Feocromocitoma (asoc. c/alfa bloqueantes).

Tirotoxicosis. Temblor esencial. Profilaxis de Infarto de miocardio, de la migraña, de la hemorragia digestiva alta en hipertensión portal y várices esofágicas y de la taquicardia



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Por vía oral, con las comidas.

Hipertensión arterial y angor: 40 mg cada 12 h, aumentar cada 3-7 días hasta 120-240 mg por día en 2 a 3 tomas. Máximo 640 mg por día.

Estenosis subaórtica: 20-40 mg cada 6-8 h.

Post IAM: 180-240 mg por día en 3-4 tomas.

Angina estable: 80-320 mg por día en 2-4 tomas.

Arritmias, ansiedad y tirotoxicosis: 10-30 mg cada 6-8 h. Máximo 160 mg por día.

Para arritmia 240 mg por día.

Arritmia en adulto mayor: iniciar con 10 mg cada 12 h.

Migraña: 80 mg por día en 3-4 tomas, aumentar 20-40 mg por dosis cada 3-4 semanas. Máximo 240 mg por día.

Temblor y hemorragia: 40 mg cada 12 h, mantener entre 120-320 mg por día.

Feocromocitoma: 30-60 mg por día en dosis divididas.

Pediatría: RN: 0.5-1 mg/kg/dosis c/6-12 h.

Niños: 1-4 mg/kg/día cada 8-12 h; dosis máxima 160 mg por día.

Migraña en < de 12 años, 20 mg cada 8-12 h. En > de 12 años ver dosis de adultos.

Arritmia, feocromocitoma y tirotoxicosis: 0.25-0.5 mg/kg cada 6-8 h.

CONTRAINDICACIONES

Bradicardia severa sintomática, bloqueo aurículoventricular de alto grado, insuf cardíaca descompensada, shock cardiogénico. Insuf. vascular con dolor en reposo, fenómeno de Raynaud. Broncospasmo o asma. Depresión severa (propranolol).

PRECAUCIONES:

Embarazo: 1er trimestre Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio. 2º y 3º trimestre Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso. Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.

Evitar su discontinuación brusca. Angina de Prinzmetal. Coadministración con depresores del nódulo sinusal y nódulo AV (verapamilo, diltiazem, amiodarona, digoxina). Pueden disminuir la actividad de los fármacos que actúan a través del sistema de los receptores beta-1.

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

En insuficiencia renal los hidrosolubles requieren ajuste de dosis. Insuficiencia hepática. Disfunción sexual eréctil variable. Miastenia Gravis. Adulto mayor.

REACCIONES ADVERSAS

Por bloqueo beta2: broncoespasmo, extremidades frías, claudicación intermitente, menos frecuentes con cardioselectivos. Bradicardia, bloqueo AV, Insuficiencia cardíaca.

Depresión, confusión, insomnio. Fatigabilidad, disfunción sexual eréctil. Discontinuación brusca puede generar arritmias, cefaleas, temblores y angor. Enmascaramiento de hipoglucemia en diabéticos insulino dependientes. Aumento de triglicéridos.

INTERACCIONES

Amiodarona, verapamilo, diltiazem potencian bloqueo de conducción AV, bradicardia y disfunción sistólica. Inductores del CYP1A2 y CYP3A4,5,7 reducen sus niveles plasmáticos, ver tabla de interacciones. Cimetidina o hidralazina incrementan los niveles plasmáticos.

Prolongan la vida media de la lidocaína. Coadministración con anestésicos puede generar hipotensión y con insulina o sulfonilureas hipoglucemia. AINEs y salicilatos disminuyen su acción hipotensora.

COMPOSICIÓN

Propranolol (ME) - 40 mg.

Productos Relacionados



\$. 142.278

Nabila ® Nebivolol 5 mg - Caja de 28 comprimidos

Agregar al Carrito

\$. 61.418

Corentel 5 Bisoprolol Fumarato 5 mg - Caja de 30

Agregar al Carrito

\$. 170.650

Nabila Nebivolol 10 mg - Caja de 28 comprimidos

Ver detalles



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

¡Enterate de nuestras novedades!

y/o

Suscribirme



Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Términos y Condiciones](#)

[Métodos de pago](#)

[Preguntas frecuentes](#)

Promociones

[B&C - BASA](#)

[B&C - UENO](#)

[B&C - SUDAMERIS](#)

[B&C - VISIÓN BANCO](#)

[B&C - Coofy](#)

[B&C - Coop. Ka'aru Pora](#)

[B&C - Promo Denis Roa](#)

Campañas

[Vacunación contra la Influenza](#)



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.