



18% off



FAPASA

En stock

Quetiazic ® Quetiapina 100 mg - Caja de 30 comprimidos recubiertos

CÓD: 619103 CÓD BARRAS: 7730979091992



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

₡. 194.371

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo
[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 194.371

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo*

OPCIONES

Cantidad

-

1

+

No disponible

 Agregar a mis favoritos

Compartir en:   

Antipsicótico atípico, del grupo de las dibenzotiazepinas

Descripción

INDICACIONES

Tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento del trastorno bipolar tipo I, fase depresiva y maníaca -en monoterapia o como coadyuvante- y mantenimiento -como coadyuvante-. Tratamiento adicional de episodios depresivos mayores en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor (TDM).



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

La dosis se establecerá individualmente de acuerdo con el criterio médico y cuadro clínico del paciente.

Quetiapina de acción inmediata:

Por vía oral, en 2 dosis diarias, evitar jugo de pomelo.

Esquizofrenia: inicio 50 mg incrementando en 100-200 mg por día hasta 300-450 mg por día. Dosis máxima 800 mg por día fraccionada en 2 dosis.

Depresión bipolar: 1er día 50 mg, 2do día 100 mg, 3er día 200 mg, 4o día 300 mg. Dosis habitual: 300 mg/día. Dosis máxima: 600 mg/día. En insuficiencia hepática y > 65 años: dosis inicial 25-50 mg/día.

Pediatría: en ≥10 años, inicio 50 mg por día, cada incremento progresivo según tolerancia y eficacia, hasta un máximo de 600 mg por día.

PRECAUCIONES

Embarazo: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio. Se han descrito síntomas extrapiramidales en el neonato cuando se administraron antipsicóticos en el 3er trimestre.

Lactancia: Potencialmente riesgosa a dosis habituales.

Son depresores del SNC por lo que potencian al alcohol y a otros depresores. Utilizar con cuidado en pacientes que realizan trabajos riesgosos o de precisión. Descienden el umbral convulsivo, especialmente los de baja potencia entre los típicos y la clozapina entre los atípicos. Hepatopatías, enfermedad renal, enfermedad respiratoria avanzada, discrasias sanguíneas, pacientes susceptibles de hipotensión arterial y cardiopatías.

Se deben evitar suspensiones bruscas del tratamiento por riesgo de inducir eventos motores anormales. Pueden inducir hipotensión arterial, hipotensión ortostática y -especialmente algunos atípicos de última generación- pueden prolongar el intervalo QTc, lo que lleva a un riesgo de arritmias (Torsade de points).

En particular los atípicos inducen alteraciones en el metabolismo glucídico y lipídico (hiperglucemia, hiperlipemia, aumento de peso), requiriendo especial cuidado en diabéticos. Se ha reportado un incremento en la incidencia de eventos cerebrovasculares, isquémicos y hemorrágicos potencialmente fatales en pacientes con demencia y síntomas psicóticos. Monitorear pacientes de alto riesgo suicida.

En particular: Hipertensión en niños y adolescentes. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 10 años.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Coma y depresión del sensorio. Enfermedad de Parkinson. Discrasias sanguíneas. Arritmias e infarto reciente. En particular: Co-administración con inhibidores de CYP3A4.

REACCIONES ADVERSAS

Por bloqueo dopaminérgico D2 en el sistema extrapiramidal: síndrome parkinsoniano, acatisia, distonías musculares agudas, disquinesia tardía. Por efecto idiosincrático: síndrome neuroléptico maligno. Por bloqueo D2 hipotálamo-hipofisario: hiperprolactinemia con galactorrea-amenorrea, ginecomastia y disminución de la libido.

Por acción antihistamínica (H1): somnolencia y aumento de peso. Por bloqueo alfa 1-adrenérgico: hipotensión ortostática, trastornos en la eyaculación. Por acción anticolinérgica antimuscarínica (M): boca seca, estreñimiento, retención urinaria, impotencia, obnubilación, agitación y delirium.

Otros efectos adversos comunes: ictericia, agranulocitosis, fotosensibilización, hipotermia, convulsiones, disfagia, prolongación del PR y QT, hiperglucemia, hiperlipemia, priapismo. Posee menor prevalencia de reacciones adversas extrapiramidales y menor incidencia de hiperprolactinemia, en comparación con los antipsicóticos típicos. Por el contrario, presentan una mayor prevalencia de hiperglucemia, diabetes mellitus, obesidad y síndrome metabólico.


INTERACCIONES

Potencian analgésicos, anestésicos y demás depresores del SNC. Antagonizan la levodopa y alfametildopa. Potencian la toxicidad de fármacos que prolongan el intervalo QT (ácido nalidíxico, norfloxacin, formoterol, propafenona), con riesgo de hipotensión arterial y arritmias. En particular: Inhibidores de CYP3A4 aumentan su concentración. Su clearance aumenta por inductores de enzimas hepáticas (al quíntuplo, con fenitoína) y con tioridazina.

COMPOSICION

Quetiapina - 100 mg

Productos Relacionados



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

₡. 165.351

Quetiazic ® Quetiapina 25 mg
- Caja de 30 comprimidos

Agregar al Carrito

₡. 109.347

Alacir 30 Duloxetine 30 mg -
Caja de 30 comprimidos

Agregar al Carrito

₡. 103.320

Celtium Escitalopram 10 mg -
Caja de 30 comprimidos

Agregar al Carrito

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular

Suscribirse



Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Contacto

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

Campañas

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.