



20% off



INDUFAR

 En stock

Braxan Ceftriaxona 1g - Polvo para inyectable

CÓD: 25972 Cód BARRAS:

Este producto requiere presentación de receta médica.

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

\$. 42.000

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo
[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

\$. 42.000

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo*


Cantidad

-

1

+

Agregar al carrito

 [Agregar a mis favoritos](#)

Compartir en:   

Antibiótico Cefalosporínico de Tercera Generación.

1 frasco-ampolla + 1 ampolla solvente anestésico I.M. + 1 ampolla solvente I.V.

Descripción

INDICACIONES

Infecciones del tracto biliar. Infecciones óseas. Infecciones del SNC. Infecciones del tracto genitourinario producidas por especies de Clostridium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Proteus mirabilis, gonorrea, neumonía, sepsis bacteriana, infecciones

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

A criterio del médico.

En pacientes con disfunción hepática y renal la dosis diaria no debe superar 2 g.

Dosis para adultos: IM o IV, 1g a 2g cada 24 horas o 500 mg a 1g cada 12 horas. Infecciones gonocócicas (no complicadas): IM, 250 mg como dosis única. Profilaxis preoperatoria: IV, 1g 30 minutos a 2 horas antes de la cirugía.

Dosis pediátricas: IM o IV, 25 mg a 37,5 mg/Kg cada 12 horas. Meningitis: IV, 50 mg/Kg cada 12 horas.

La terapéutica puede iniciarse con una dosis de carga de 75 mg/Kg o sin ella

CONTRAINDICACIONES

Se evaluará la relación riesgo-beneficio en pacientes con antecedentes de enfermedad gastrointestinal, en especial colitis ulcerosa y disfunción renal.

PRECAUCIONES

En los pacientes diabéticos pueden producirse reacciones falso positivas para los análisis de glucosa en orina que utilizan sulfato de cobre. Si bien atraviesa la placenta no se han demostrado efectos adversos en el feto. También se excreta en la leche materna, normalmente en bajas concentraciones.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Son de incidencia rara calambres, dolor y distensión abdominal, diarrea acuosa y grave, fiebre, aumento de la sed, náuseas, vómitos, pérdida de peso no habitual, rash cutáneo, prurito, edema (por hipersensibilidad).

INTERACCIONES

El Probenecid disminuye la secreción tubular renal, lo que da como resultado un aumento y prolongación de las concentraciones séricas de Ceftriaxona.

COMPOSICIÓN

Cada frasco-ampolla contiene:

Ceftriaxona (como sal sódica) - 1 g

Cada ampolla de solvente anestésico uso IM contiene:



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Cada ampolla de solvente uso IV contiene:

Agua para Inyección - 10 mL

Productos Relacionados

<div>Ⱶ. 33.220</div> <div>CECAN 1 GRAMO - CAJA DE 1 AMPOLLA</div> <div>Agregar al Carrito</div>	<div>Ⱶ. 50.400</div> <div>Cefive I.V. Ceftriaxona 1g - Caja de 1 frasco</div> <div>Agregar al Carrito</div>	<div>Ⱶ. 40.542</div> <div>CEPROX 1 GR. I.V.FCO. - CAJA DE 1 AMPOLLA</div> <div>Agregar al Carrito</div>	<div>Ⱶ.</div> <div>Lucofen C - Caja de</div> <div>Agr C</div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

¡Enterate de nuestras novedades!

y/o

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

Campañas

Vacunación contra la Influenza



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.