



20% off



MEDICAL

 En stock

Glicomed Metformina 850 mg - Caja de 30 comprimidos

CÓD: 27294 CÓD BARRAS: 7840653002821



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

₡. 39.920

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 39.920

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo***Cantidad**

- 1 +

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Normoglucemiante oral.

Descripción**INDICACIONES**

Diabetes mellitus no insulino dependiente (DMNID), especialmente en pacientes obesos e hipersensibles a las sulfonilureas. En pacientes que muestran poca respuesta a la dieta sulfonilurea sola. Como complemento de la insulinoterapia en diabetes tipo I. Diabetes inestable. Diabetes insulino resistentes.

DOSIFICACIÓN

Se adaptará a criterio médico y al cuadro del paciente



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Como posología media de orientación se aconseja: En diabetes no insulino dependiente: la dosis inicial recomendada es de 850 mg una vez por día. En los casos que se utilice el comprimido de 850 mg la dosis puede ser ajustada cada dos semanas. La dosis máxima admitida es de 3.000 mg por día. Se recomienda administrar con las comidas o después de ellas.

En diabetes insulino dependiente: se aconseja administrar en forma simultánea con insulina con el objeto de reducir la dosis de la misma, adaptando la dosificación de insulina diaria mediante la medición de glucemia capilar. Cuando la dosis diaria de insulina es menor a 40 unidades, la dosis de Metformina será de 500 a 850 mg dos veces por día y al mismo tiempo se reducirán de 2 a 4 unidades de insulina cada 2 días, según la evolución de la glucemia. Si la dosis de insulina es superior a 40 unidades por día se aconseja una mayor vigilancia sobre el paciente para realizar la asociación, administrando el medicamento a la dosis aconsejada. La dosis de insulina puede disminuir en un 30-50%.

"Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran".

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los componentes de la formulación. Contraindicado en insuficiencia renal, hepática o respiratoria que puede resultar también por condiciones como colapso cardiovascular (shock), infarto del miocardio y sepsis. Insuficiencia cardíaca congestiva que requiere tratamiento farmacológico. Acidosis metabólica aguda o crónica, incluyendo cetoacidosis diabética, con o sin coma. Alcoholismo crónico. Embarazo. No existen informes del uso de Metformina durante la lactancia.

PRECAUCIONES

La diabetes, sobre todo cuando está mal controlada, la insuficiencia renal orgánica o funcional, la insuficiencia hepática, la juvenil, el alcohol, la cetosis y los estados que se acompañan de hipoxemia, son factores que predisponen a la acidosis láctica. Estos factores deben ser buscados periódicamente en pacientes bajo tratamiento, particularmente las personas de más de 60 años, que es donde aparecen con más frecuencia. En presencia de estos factores de riesgo conviene suspender inmediatamente el tratamiento.

GLICOMED 850 contiene como excipiente Lactosa Monohidrato 0,013 g por cada comprimido ranurado lo que debe ser tomado en cuenta en pacientes con problemas de absorción de glucosa o galactosa, galactosemia o insuficiencia de lactosa. También contiene como excipiente Alcohol etílico 0,09 g por cada comprimido ranurado lo que puede ser causa de riesgo en niños.

EFFECTOS SECUNDARIOS



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

factores predisponentes tales como insuficiencia renal y colapso circulatorio.

INTERACCIONES

Metformina potencia el efecto de anticoagulantes y fibrinolíticos. Metformina inhibe la absorción de vitamina B12, en casos aislados. Metformina con otros agentes hipoglucemiantes, puede causar hipoglucemia. Disminuyen el efecto de Metformina: diuréticos tiazídicos, rifampicina, corticoesteroides, hormonas tiroideas, anticonceptivos orales, clorpromazina, simpaticomiméticos. Pueden reducir la excreción renal de Metformina los antiinflamatorios no esteroideos, y cimetidina, aumentando el riesgo de acidosis láctica

COMPOSICIÓN

Cada comprimido ranurado de GLICOMED 850 contiene:

Metformina HCl - 850 mg

Excipientes:

Lactosa Monohidrato - 12,72 mg

Alcohol Etílico - 0,07 mL

Otros Excipientes - c.s.

Productos Relacionados



\$. 57.564

Diaformina Lp 1000 mg
Metformina Clorhidrato 1000

Agregar al Carrito

\$. 46.904

Diaformina Lp 500 mg
Metformina Clorhidrato 500

Agregar al Carrito

\$. 26.800

Glicomed Metformina 850 mg
- Caja de 30 comprimidos

Agregar al Car



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

¡Enterate de nuestras novedades!

y/o

Suscribirme



Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Términos y Condiciones](#)

[Métodos de pago](#)

[Preguntas frecuentes](#)

Promociones

[B&C - BASA](#)

[B&C - UENO](#)

[B&C - SUDAMERIS](#)

[B&C - VISIÓN BANCO](#)

[B&C - Coofy](#)

[B&C - Coop. Ka'aru Pora](#)

[B&C - Promo Denis Roa](#)

Campañas

[Vacunación contra la Influenza](#)



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.