



20% off



ETICOS

 En stock

## Cognil ® 10 Metilfenidato 10 mg - Caja de 30 comprimidos

CÓD: 45992   CÓD BARRAS: 7841134000381

Este producto requiere presentación de receta médica.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Precios

Venta al Público	₡. 121.000
Cliente No Fiel	₡. 96.800

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo  
[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel **₡. 96.800**

*\* Precio exclusivo para compras con pago en efectivo*


Cantidad

-

1

+

Agregar al carrito

 [Agregar a mis favoritos](#)    Compartir en:   

Estimulante del sistema nervioso central.

Descripción

INDICACIONES

Trastorno de hiperactividad / déficit de atención (THDA). Narcolepsia e hipersomnias primarias (somnolencia excesiva).

DOSIFICACIÓN



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Adultos: Administrar en 1 a 2 dosis (30 a 45 minutos antes de las comidas). Última dosis del día: antes de las 6:00 p.m.

Niños mayores de 6 años: Iniciar con una dosis de 5 mg una o dos veces al día, antes del desayuno y el almuerzo.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la droga. Estados de ansiedad, depresión o agitación. Pacientes con tics o historia familiar de síndrome de La Tourette, psicosis, hipertensión, hipertiroidismo, arritmias cardíacas, angina pectoris grave y glaucoma. Embarazo. Lactancia.

## PRECAUCIONES

El metilfenidato no deberá administrarse a niños menores de 6 años por no haberse establecido la seguridad y eficacia a esta edad. En los niños psicóticos la administración de metilfenidato puede exacerbar los síntomas del trastorno de la conducta y la ideación. La presión arterial se controlará en intervalos adecuados principalmente a los pacientes que padezcan hipertensión.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios más comunes incluyen nerviosismo e insomnio. Pérdida pasajera del apetito. Cefalea, somnolencia, vértigo, disquinesia, dificultades de la acomodación y visión borrosa. Dolor abdominal, náuseas, vómitos. Sequedad de boca. Taquicardia, palpitaciones, arritmias, cambios en la tensión arterial y la frecuencia cardíaca.

## INTERACCIONES

El metilfenidato puede potenciar las acciones de los vasopresores exógenos y endógenos. Deberá evitarse el uso concomitante con IMAOs. Estudios farmacológicos en humanos han mostrado que el metilfenidato puede inhibir el metabolismo de ciertos anticonvulsivantes, lo cual puede llevar a un incremento en las concentraciones séricas. Lo mismo puede suceder por la administración concomitante de metilfenidato y antidepresivos tricíclicos.

## COMPOSICIÓN

Cada comprimido de Cognil® 10 mg contiene:

Metilfenidato HCl - 10,0 mg.

Excipientes - c.s.

## Productos Relacionados



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

₡. 63.960

Bolixin Modafinilo 200 mg -  
Caja de 30 comprimidos

[Agregar al Carrito](#)

₡. 147.400

Cognil ® 20 Metilfenidato 20  
mg - Caja de 30 comprimidos

[Agregar al Carrito](#)

₡. 214.961

Consiv Metilfenidato  
Clorhidrato 18 mg - Caja de

[Agregar al Carrito](#)

## ¡Enterate de nuestras novedades!

y/o

[Suscribirse](#)

### Call Center

Llámanos desde tu celular:

[Llamar ahora](#)

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.



## Institucional

[Responsabilidad Social](#)

[Blog](#)

[Contacto](#)

## Atención al cliente

[Sucursales](#)

[Términos y Condiciones](#)

[Métodos de pago](#)

[Preguntas frecuentes](#)

## Promociones

[B&C - BASA](#)

[B&C - UENO](#)

[B&C - SUDAMERIS](#)

[B&C - VISIÓN BANCO](#)

[B&C - Coofy](#)

[B&C - Coop. Ka'aru Pora](#)

[B&C - Promo Denis Roa](#)

## Campañas

[Vacunación contra la Influenza](#)



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165  
Cadena Farmacenter S.A.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.