



20% off



LIBIONS

 En stock

# Limine ® Ondansetron 4 mg - Caja de 1 ampolla de 2 ml

CÓD: 820   CÓD BARRAS: 7848002040081



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

₡. 29.106

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo  
[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 29.106

*\* Precio exclusivo para compras con pago en efectivo***Cantidad**

-

1

+

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Antiemético.

**Descripción****INDICACIONES**

Prevención de vómitos y náuseas postoperatorios. Prevención y tratamiento de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia o radioterapia. También se usa en la gastroenterocolitis aguda con vómitos reiterados para facilitar la rehidratación oral, en pediatría y en la hipertiroidismo gravídica refractaria y severa.

**POSOLOGÍA**

La dosis se establecerá individualmente de acuerdo con el criterio médico y cuadro clínico.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

En cirugía: por vía I.M. o I.V. en 2-5 min dosis única de 4 mg; como prevención 30 min antes de terminar la cirugía, o 16 mg por V.O., S.L. una hora antes de la cirugía.

Pediatría: En cirugía: 1 mes a 12 años: Por vía I.V. en 2-5 min: < de 40 kg de peso: 0.1 mg/kg, en > 40 kg de peso: 4 mg, dosis única.

## CONTRAINDICACIONES

Coadministración con apomorfina.

## PRECAUCIONES

Embarazo: Evidencia en humanos de aumento de riesgo de defectos de cierre orofaciales (labio leporino, paladar hendido) y malformaciones cardíacas. Evitar su uso durante el primer trimestre del embarazo. Lactancia: Se absorbe a nivel sistémico. Se excreta en leche materna. Evidencia insuficiente, evaluar riesgo/beneficio.

Pacientes con prolongación del intervalo QT, alteraciones electrolíticas, insuficiencia cardíaca congestiva, bradiarritmias o que reciban fármacos que prolonguen el intervalo QT. Obstrucción intestinal subaguda. Uso de antidepresivos ISRS (Sind. serotoninérgico). Insuficiencia hepática ajustar dosis, no exceder 8 mg por día. En insuficiencia renal y adulto mayor no requiere ajustar dosis. En mujeres en edad reproductiva, usar medidas anticonceptivas eficaces.

## REACCIONES ADVERSAS

Estreñimiento, diarrea, cefalea, mareos. Poco frecuentes: prolongación del intervalo QT con riesgo de arritmias graves incluyendo torsade de pointes. Raras: convulsiones, trastornos del movimiento reacciones extrapiramidales, crisis oculógiras y discinesia.

## INTERACCIONES

Su efecto es aumentado por dexametasona. Su efecto es disminuido por aminoglutetimida, carbamazepina, nevirapina, fenobarbital, fenitoína y rifampicina. Evitar fármacos que prolonguen el intervalo QT (ácido nalidíxico, norfloxacin, formoterol, propafenona).

## COMPOSICIÓN

Clorhidrato de ondansetrón - 4 mg

## Productos Relacionados



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

₡. 37.600

Egastal 8 Ondansetron 8mg /  
4 ml - Caja de 1 ampolla de 4

Agregar al Carrito

₡. 66.056

Limine ® Ondansetron 8 mg -  
Caja de 1 ampolla de 4 ml

Agregar al Carrito

## ¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular

Suscribirse



### Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

### Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

### Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

### Campañas

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165  
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.