Denominación Comercial	Composición y Principio Activo	Clasificación y Grupo Químico	Plagas	Clase Toxicol.	Dosificación Cantidad de c.c. x Litro de solvente
Supermyl	Cipermetrina 25%	Insecticida Piretroide	Insectos Rastreros y Voladores	II	1cc por cada litro de agua (Método Utilizado: Aspersión, Pulverización y nebulización)
Cucaxan	Fipronil 0,05%	Insecticida, cebo en gel cucarachicida.	Cucarachas y Cucarachitas alemanas- huevos	II	Colocar de 5 mm en zócalos, estanterías, cajones, cañerías y detrás de los muebles
Storm	Flocoumafen 0,005%	Cumarinas Cebo en Bloques(BB) Rodenticida	Rata común, Lauchas u otras especies	IV	Colocar cebos en portacebos en forma perimetral y donde se detecte rastros de actividad.
Mtiris Raticida	Brodifacoum 0,005%	Cumarinas Rodenticida en pellets	Rata común, Lauchas u otras especies	II	Colocar cebos en portacebos en forma perimetral y donde se detecte rastros de actividad.
Matiris Polvo Carbaryl	Carbamatos 4,25%	Insecticida Carbamato	Hormigas, ysa`u, akeke	II	Espolvorear el producto en el área afectada (hormigueros, camino de hormigas) utilizar 5g/m2. Aplicar antes del riego, así también cuando las condiciones pronostican lluvias
K-FOL	Imidacloprid 70%	Insecticida Nitroguanidinas	Termitas	III	1cc por cada litro de agua (Método Utilizado: Aspersión, Pulverización y nebulización)
Tecnup	Glisofato 36%	Herbicida derivado de la glicina	Control de malezas, yuyos	IV	10 cc de producto por cada litro de agua (Método Utilizado: Aspersión, Pulverización)
Spanta Pombo	Aloe de Canela 6% Polibuteno 80 %)	Polimero de Isobuteno Gel repelente no toxico	Palomas, murcielagos		Colocar el gel en forma de zigzag donde se detecte actividad

Ing. Jorge Daniel Arguello Aquino
Asesor Técnico – Reg. Nº 6.696

J.D. Servicios
De Ing. Agr. Jorge Argüello Aquino
RUC:3.378.226-1
11 OCT 2024